# Keuze groenbemester in relatie tot belangrijkste aaltjes en ziekten

| | | | |
|---|---|---|---|
| maart tm aug. | Wit en geel bietencysteaaltje<br>*waardplanten: bieten, spinazie, koolsoorten en vlinderbloemigen* | Bladrammenas BCA 1 of BCA 2<br>*> 90% afbraak of 70-90% afbraak van de populatie wit bietencystenaaltje/natuurlijke afname geel bietencystenaaltje* | 20-25 kg |
| | | Bladrammenas | 20-25 kg |
| | Maïswortelknobbelaaltje<br>*kwalitatieve schade bij aardappel, peen en schorseneer* | Multiresistente Bladrammenas | 20-25 kg |
| | | Bladrammenas | 20-25 kg |
| | Tabaksratelvirus<br>*kringerigheid in aardappel, tulpen en gladiolen* | Bladrammenas | 20-25 kg |
| maart tm sept. | Noordelijk wortelknobbelaaltje<br>*aardappel, peen en vlinderbloermigen zijn goede waardplanten* | Engels/Italiaans raaigras | 25-40 kg |
| | Maïswortelknobbelaaltje | Engels raaigras | 25-40 kg |
| | Stengelaaltje<br>*schade in uien, tulpen en bolgewassen, vlinderbloemigen, maïs, aardappelen peen en suikerbieten* | Engels/Italiaans raaigras | 25-40 kg |
| | Sclerotinia sclerotorum<br>*aardappel, koolzaad, peen, chichorei, sluitkool, erwt, witlof, veldboon en stamslaboon zijn schadegevoelig* | Engels/Italiaans raaigras | 25-40 kg |
| half mei tm half juli | Aardappelcysteaaltje<br>*nog relatief weinig van bekend; alle traditionele groenbemesters geven een natuurlijke afname* | Raketblad (iets beter dan braak) | 3 kg/ha |
| mei tm aug. | Wortellesieaaltje (P. penetrans)<br>*schadelijk in o.a. peen, aardappelen, lelie en narcis* | Tagetes patula | 7 kg |
| | Noordelijk wortelknobbelaaltje | Tagetes patula | 7 kg |
| | Wit en geel bietencysteaaltje | | |
| | Maïswortelknobbelaaltje<br>*kwalitatieve schade bij aardappel, peen en schorseneer* | | |
| mei tm okt. | Wortellesieaaltje (P. penetrans) | Japanse haver op braakland | 70 kg |
| | Sclerotinia sclerotorum | | |
| juli tm sept. | Wit en geel bietencysteaaltje | Gele mosterd BCA 2 | 20-25 kg/ha |
| | | Gele mosterd | 20-25 kg/ha |
| aug. tm nov. | Wit en geel bietencyste aaltje | Rogge | 70 kg |
| | Noordelijk wortelknobbelaaltje<br>*tarwe of maïs geeft ook natuurlijke afname* | | |
| | Sclerotinia sclerotorum | | |

Bij problemen met wortelonkruiden is een grasgroenbemester de beste keuze.

natuurlijke afname | actieve afname | lichte vermeerdering; minder/minst slechte groenbemester